TARJETAS PARA BILLETERA DE IDHIFA®

¿Qué debo hacer con estas tarjetas para billetera?

- Complete estas tarjetas, córtelas, dóblelas, guarde una para usted y entregue la otra a su cuidador.
- Usted y su cuidador deben colocar uno en cada una de sus billeteras.
- Si visita a la sala de emergencias o a un médico que no pertenece a su equipo de atención médica habitual, muestre esta tarjeta para que sepa que está recibiendo tratamiento con IDHIFA® (enasidenib).
- Desplácese hacia abajo hasta las páginas 2 y 3 para obtener más información

Tarjeta para billetera del paciente

Doblar aquí

Tengo LMA y estoy recibiendo tratamiento que puede causar un efecto secundario grave: síndrome de diferenciación.

Conserve esta tarjeta en su billetera y preséntela a cualquier médico que no forme parte de su equipo de atención médica habitual.

Nombre del paciente:

Medicamento(s) actual(es) para la LMA:

Nombre y n.° del oncólogo:

Nombre y n.° de contacto en caso de emergencia:

Para obtener más información, escanee el código QR.

O visite ManagingMyAMLTreatment.com

2018-US-2200030 05/22

Tarjeta para billetera del cuidador

Doblar aquí

Cuido de alguien con LMA que recibe tratamiento y que puede causar un efecto secundario grave: síndrome de diferenciación.

Conserve esta tarjeta en su billetera y preséntela a cualquier médico que no forme parte de su equipo de atención médica habitual.

Nombre del paciente:

Medicamento(s) actual(es) para la LMA:

Nombre y n.° del oncólogo:

Para obtener más información, escanee el código QR.

O visite ManagingMyAMLTreatment.com

2018-US-2200030 05/22

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas anteriores y haga clic aquí para obtener toda la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

IDHIFA® (enasidenib) tablets 100mg • 50mg

¿Qué es IDHIFA® (enasidenib)?

IDHIFA® es un medicamento recetado que se usa para tratar a personas con leucemia mieloide aguda (LMA) con una mutación de isocitrato deshidrogenasa-2 (isoocitrate dehydrogenase-2, IDH2) cuya enfermedad ha reaparecido o no ha mejorado después de tratamiento(s) previos. Se desconoce si IDHIFA® es seguro y eficaz en niños.

¿Cuál es la información más importante que debo conocer sobre IDHIFA®?

IDHIFA® puede causar efectos secundarios graves, incluido el síndrome de diferenciación.

¿Qué es el síndrome de diferenciación?

El síndrome de diferenciación es una afección que afecta las células sanguíneas y puede ser potencialmente mortal o provocar la muerte si no se trata.

¿Cuándo podría suceder?

El síndrome de diferenciación ha ocurrido en el plazo de 1 día y hasta 5 meses después de comenzar a recibir IDHIFA®.

¿Cuáles son los signos y síntomas del síndrome de diferenciación que debe buscar?



Llame a su proveedor de atención médica o diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato si presenta alguno de los síntomas anteriores de síndrome de diferenciación mientras toma IDHIFA®.

¿Cómo se trata el síndrome de diferenciación?

Si desarrolla alguno de estos síntomas del síndrome de diferenciación, es posible que su proveedor de atención médica comience a administrarle un medicamento que se toma por vía oral o que se administra a través de una vena (intravenosa) denominado corticosteroides, y puede monitorearlo en el hospital.

Antes de tomar IDHIFA®, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, por ejemplo:

- Está embarazada, planea quedar embarazada o cree que podría estar embarazada durante el tratamiento con IDHIFA®. IDHIFA® puede causar daño al bebé en gestación si se toma durante el embarazo.
  — Si puede quedar embarazada, su proveedor de atención médica le hará una prueba para la detección del embarazo antes de que comience a tomar IDHIFA®.

Las mujeres que puedan quedar embarazadas y tomen IDHIFA® deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con IDHIFA® y durante, al menos, 2 meses después de la última dosis de IDHIFA®.

Los hombres que tienen parejas de sexo femenino que pueden quedar embarazadas deben usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con IDHIFA® y durante al menos 2 meses después de su última dosis de IDHIFA®.

Consulte la Información importante de seguridad en las páginas anteriores y haga clic aquí para obtener toda la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

IDHIFA®
(enasidenib) tablets
100mg • 50mg

¿Cómo afecta IDHIFA® la fertilidad y la capacidad de amamantar?

- IDHIFA® puede afectar la manera en que funcionan los anticonceptivos hormonales y puede hacer que no funcionen bien
- Hable con su proveedor de atención médica sobre los métodos anticonceptivos que pueden ser adecuados para usted mientras toma IDHIFA®.
- IDHIFA® puede causar problemas de fertilidad en mujeres y hombres, lo que puede afectar su capacidad de tener hijos. Hable con su proveedor de atención médica si tiene inquietudes sobre la fertilidad.
- ¿Está amamantando o planea amamantar? Se desconoce si IDHIFA® pasa a la leche materna. No debe amamantar durante su tratamiento con IDHIFA® y durante al menos 2 meses después de su última dosis de IDHIFA®.

¿Qué más debo decirle a mi proveedor de atención médica?

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que tome, incluidos los medicamentos de venta con receta y los de venta libre, las vitaminas y los suplementos herbarios.

¿Cómo debo tomar IDHIFA®?

- Tome IDHIFA® exactamente como se lo indique su proveedor de atención médica.

- Tome IDHIFA® **1 vez al día a la misma hora todos los días.**
- Trague los comprimidos de IDHIFA® enteros **con 8 onzas (1 taza) de agua.** No mastique ni divida el comprimido
- IDHIFA® puede **tomarse con o sin alimentos**

- Si omite una dosis de IDHIFA® o vomita después de tomar una dosis de IDHIFA®, tome la dosis de IDHIFA® lo antes posible el mismo día. Luego, tome su siguiente dosis al día siguiente a la hora programada regularmente. **No** tome 2 dosis al mismo tiempo para compensar la dosis omitida.
- Su proveedor de atención médica debe realizar análisis de sangre para controlar sus recuentos sanguíneos antes de que comience el tratamiento con IDHIFA® y, como mínimo, cada 2 semanas durante, al menos, los primeros 3 meses durante el tratamiento para detectar efectos secundarios.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de IDHIFA®?

IDHIFA® puede causar efectos secundarios graves, incluidos los siguientes:

Síndrome de diferenciación. Para obtener más información, consulte la página anterior.

Los efectos secundarios más frecuentes de IDHIFA® incluyen los siguientes:

- Náuseas
- Vómitos
- Diarrea
- Ictericia
- Disminución del apetito

Informe a su proveedor de atención médica si tiene algún cambio en el color de la piel o en la parte blanca de los ojos.

Su proveedor de atención médica lo controlará para detectar efectos secundarios durante el tratamiento y puede indicarle que deje de tomar IDHIFA® si presenta determinados efectos secundarios. Estos no son todos los posibles efectos secundarios de IDHIFA®. Llame a su médico para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. También puede notificar los efectos secundarios a la FDA, llame al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de IDHIFA®.

A veces se prescriben medicamentos para fines distintos de los que figuran en la Guía del Medicamento. No use IDHIFA® para una afección para la que no se haya prescrito. No dé IDHIFA® a otras personas, incluso si tienen los mismos síntomas que usted. Podría causarles daño. Puede solicitar a su proveedor de atención médica o al farmacéutico información sobre IDHIFA® redactada para profesionales de atención médica.

Haga clic aquí para ver la Información de prescripción completa, incluido el recuadro de ADVERTENCIA y la Guía del medicamento.

Visite IDHIFA.com/myAML para obtener más información y descargar copias adicionales de las tarjetas de billetera

Bristol Myers Squibb™ | SERVIER

IDHIFA® (enasidenib) tablets 100mg • 50mg

© 2022 Bristol-Myers Squibb Company.
IDHIFA es una marca comercial de Celgene Corporation, una compañía de Bristol Myers Squibb.
IDHIFA cuenta con la licencia de Servier Pharmaceuticals, LLC.
2018-US-2200030 05/22